

NOTICE DE JEAN-MICHEL BISMUT (JUIN 2021)

JEAN-MICHEL BISMUT

Dans mon travail de mathématicien, j'ai abordé sept domaines :

- (1) L'optimisation stochastique.
- (2) Le calcul de Malliavin et la mécanique aléatoire.
- (3) Le théorème de l'indice.
- (4) Les invariants η , et la torsion analytique de Ray-Singer réelle ou complexe.
- (5) Les déformations hypoelliptiques du laplacien.
- (6) La formule des traces.
- (7) La cohomologie de Bott-Chern et le théorème de Riemann-Roch.

Avant de décrire ces travaux de manière plus précise, je dirai que la théorie des probabilités et le calcul des variations y jouent un rôle essentiel. Mes travaux en théorie de l'indice montrent l'importance d'un formalisme de type cohomologique dans l'intégrale fonctionnelle.

En réalité, j'estime n'avoir travaillé que sur un seul et même sujet, dont l'unité ne m'est apparue que progressivement. Le fait que les équations que j'utilise pour décrire quelques aspects de la formule des traces soient essentiellement les mêmes que celles que j'avais dégagées quand je travaillais sur le principe du maximum stochastique ne doit rien au hasard, mais plutôt à la nécessité. Seul les sépare un certain labeur.

Dans cette notice, je ne passe en revue que quelques travaux, renvoyant à la bibliographie complète pour plus de détails.

1. TRAVAUX D'OPTIMISATION STOCHASTIQUE

Dans des travaux contenus dans ma thèse, j'établis un principe du maximum pour des équations différentielles stochastiques. Rappelons en effet que si on contrôle une équation différentielle ordinaire du type $\dot{x}_t = f(t, x_t, u_t)$ en rendant extrémale une fonctionnelle du type $\int_0^T L(t, x_t, u_t) dt$, sous des hypothèses adéquates, le principe de Pontryagin nous permet de construire un Hamiltonien $H(t, x, p)$. L'extrémalisation de la fonctionnelle considérée conduit alors soit à des équations d'Euler-Lagrange, soit à des équations de Hamilton.

Dans [3, 15, 20], j'ai obtenu un principe de Pontryagin pour des équations différentielles stochastiques de Itô du type

$$(1) \quad dx_t = f(t, x_t, u_t) dt + \sum_1^m \sigma_i(t, x_t, u_t) \delta w^i,$$

quand on veut rendre extrémale une fonctionnelle du type $E \int_0^T L(t, x_t, u_t) dt$. Les équations de Hamilton sont maintenant remplacées par des équations différentielles stochastiques. J'ai appliqué ce type de résultats soit à des équations différentielles

stochastiques linéaires avec critère quadratique dans [6, 13], soit à des systèmes stochastiques contraints [4]. J'ai également donné des applications du principe du maximum en économie mathématique [5]. L'idée qu'on peut déformer un processus stochastique se retrouve dans l'ensemble de mes travaux ultérieurs, qu'ils soient consacrés à la mécanique aléatoire, au calcul de Malliavin, au théorème de l'indice ou au Théorème de Riemann-Roch.

Une autre série de travaux a été consacrée à des problèmes variationnels sur des processus de Markov. Ceci a donné lieu au travail [7] consacré au contrôle des diffusions markoviennes (où on contrôle la « dérive » du processus). La référence [14] représente une synthèse des deux points de vue. J'ai également étendu les méthodes précédentes à des processus plus généraux, comportant des sauts [12].

Les techniques de contrôle des mesures de probabilité associées à divers processus de Markov m'ont alors amené à considérer d'autres problèmes où on extrémalise une fonctionnelle sur un ensemble non trivial de mesures. Il s'agit essentiellement des problèmes d'arrêt optimal. Dans une série de travaux menés en partie avec Skalli [8], [9], [10], [11], [91], [16], [17], [18], [19], [21] motivés en partie par la caractérisation par Rost des mesures associées à des temps d'arrêt à l'aide des fonctions excessives du processus de Markov considéré, j'ai étudié de questions d'arrêt optimal de processus de Markov, d'arrêt optimal avec contrôle, de jeux à somme nulle avec arrêt optimal, de contrôle de processus alternants, avec une fonctionnelle dépendant du nombre et de la position des transitions. Dans ces problèmes, j'ai de nouveau mis en œuvre des techniques d'optimisation convexe, en définissant un problème dual du problème initial, et en reliant les deux problèmes duaux par des conditions d'extrémalité classique

2. CALCUL DE MALLIAVIN ET MÉCANIQUE ALÉATOIRE

Malliavin avait introduit la notion de flot d'une équation différentielle stochastique, et développé un calcul différentiel sur l'espace de Wiener, qui appliqué aux équations différentielles stochastiques, permettait de démontrer des résultats d'analyse du semi-groupe de la chaleur d'une diffusion à l'aide de l'équation différentielle stochastique correspondante.

Dans [23, 24], j'ai montré que la formule d'intégration par parties de Malliavin pouvait être considérée comme une conséquence de la formule de Girsanov, reliée à la formule de représentation d'Hausman des variables aléatoires du mouvement brownien comme intégrales stochastiques. Dans un travail mené avec D. Michel [86, 87], nous avons appliqué le calcul de Malliavin à des problèmes de filtrage. Dans [22], j'ai démontré une formule de Itô pour l'image d'une diffusion par un flot stochastique sur \mathbf{R}^n . Je démontre en particulier que le flot est effectivement un flot de difféomorphismes de \mathbf{R}^n .

Le livre [26] est consacré à l'étude précise du calcul différentiel associé à des flots stochastiques. On développe une théorie de cycles aléatoires associés à des équations différentielles stochastiques, et on intègre des formes différentielles sur ces cycles. On introduit l'idée que les équations de Hamilton associées à un problème variationnel classiques peuvent être convenablement perturbées par un mouvement brownien, idée que je reprendrai dans mes travaux sur le laplacien hypoelliptique [49].

Dans [29], je développe un calcul des variations stochastiques pour les processus de sauts. Dans [30, 32], je montre comment la théorie des excursions browniennes

permet d'utiliser les propriétés d'invariance du mouvement brownien par changement de temps pour obtenir des formules naturelles d'intégration par partie sur des processus de sauts.

Dans [31], je montre que le calcul de Malliavin possède une version déterministe. Je démontre une formule d'intégration par parties sur le mouvement brownien d'une variété Riemannienne. Une autre propriété d'invariance du mouvement brownien par action du groupe orthogonal local \mathfrak{y} est utilisée, qui explique l'apparition du tenseur de Ricci dans la formule. On obtient le développement asymptotique du noyau de la chaleur par utilisation de l'équation différentielle stochastique sous-jacente.

Dans [35], l'étude des problèmes avec conditions limites conduit à l'étude d'une décomposition des trajectoires browniennes jusqu'à un temps dont la loi est la mesure de Lebesgue. On donne aussi une décomposition correspondante des excursions browniennes, étroitement reliée à la décomposition de Williams.

3. LE THÉORÈME DE L'INDICE

Lors d'une conférence en l'honneur de Laurent Schwartz en 1983, M.F. Atiyah fit un exposé consacré aux travaux de Witten sur le théorème de l'indice. Witten montrait en effet que formellement, la formule de McKean-Singer pour l'indice d'un opérateur de Dirac agissant sur les spineurs d'une variété riemannienne X peut s'écrire sous la forme d'une intégrale fonctionnelle 'supersymétrique' sur l'espace des lacets LX . De manière équivalente, on intègre sur l'espace des lacets une forme différentielle fermée pour l'opérateur $d + i_K$, où K est le vecteur vitesse engendrant l'action naturelle de S^1 sur LX . Un argument algébrique de localisation montre que cette intégrale doit se localiser sur $X \subset LX$ vu comme la variété des zéros de K . L'application de cette formule conduit directement et sans analyse à la 'preuve' du théorème de l'indice.

Cet exposé m'a conduit à donner une preuve probabiliste du théorème de l'indice et des formules de point fixe de Lefschetz [27, 28]. Le genre \hat{A} est obtenu à l'aide de la formule d'aide de Paul Lévy.

L'exposé d'Atiyah m'avait particulièrement perturbé, car il montrait qu'était à l'œuvre dans l'intégrale fonctionnelle brownienne un mécanisme algébrique, invisible pour un probabiliste. Dans [33], j'ai montré que les considérations d'Atiyah et Witten s'appliquent à tous les opérateurs de Dirac. On construit en particulier un relèvement naturel de la forme sur X pour le caractère de Chern en une forme équivariante sur LX . J'élabore un dictionnaire de plus en plus précis permettant de passer du formalisme des opérateurs à l'intégration de formes différentielles sur l'espace des lacets.

Après avoir cherché à étendre les preuves connues des formules de localisation à LX , je montre dans [37] que la preuve du théorème de l'indice par l'équation de la chaleur peut être considérée comme l'application à LX d'une preuve existant universellement pour les formules de localisation. Je montre en particulier que le mécanisme des *fantastic cancellations* de McKean-Singer n'est pas un miracle lié particulièrement au théorème de l'indice, mais existe en tant que phénomène universel pour toutes les formules de localisation.

La compréhension du mécanisme de localisation me conduit à donner dans [34] une preuve par l'équation de la chaleur de formules de Lefschetz délocalisées, à

la Kirillov. Je lis un article de Quillen, où il propose une nouvelle théorie des superconnexions, unifiant algébriquement le formalisme de la théorie de Chern-Weil et le formalisme du théorème de l'indice. Quillen indique que ce formalisme devrait conduire à une preuve du théorème de l'indice des familles par l'équation de la chaleur. Or le résultat de [34] est précisément une telle preuve dans le contexte équivariant. Dans [36], je donne une preuve par l'équation de la chaleur du théorème de l'indice des familles, par l'introduction de la superconnexion de Levi-Civita naturellement associée à une fibration.

Le formalisme des superconnexions se prête naturellement au calcul de formes de transgression. J'assiste à un exposé de Quillen où il propose un lien entre théorème de l'indice des familles et sa démonstration d'un théorème de courbure pour le fibré déterminant d'une famille de connexions sur un fibré au dessus d'une surface de Riemann fixe. Avec Freed [68, 69], nous donnons une construction par transgression d'une métrique et d'une connexion unitaires sur le fibré déterminant d'une famille d'opérateurs de Dirac, et nous donnons un théorème de courbure local pour cette connexion. La superconnexion de Levi-Civita joue un rôle essentiel dans la construction. Nous lions l'holomorphie en 0 de la fonction η d'un opérateur de Dirac au mécanisme des *fantastic cancellations*. Nous montrons un théorème d'holonomie conjecturé par Witten, qui indique que l'holonomie de la connexion décrite précédemment au dessus d'un lacet de la base est la limite adiabatique des invariants η du cylindre construit au dessus de ce lacet.

Dans [39], je relie la superconnexion de Levi-Civita à mes résultats antérieurs sur le filtrage. Dans [38], je donne une preuve par l'équation de la chaleur des inégalités de Demailly. L'intérêt de cette preuve est qu'elle est parallèle à la preuve du théorème de l'indice, et que la formule de Paul Lévy y joue encore un rôle crucial. Naturellement, ce n'est pas un hasard.

4. INVARIANTS η ET TORSION ANALYTIQUE DE RAY-SINGER

Avec Cheeger [63], j'étudie la limite adiabatique des invariants η des variétés fibrées. Nous construisons les formes de transgression $\tilde{\eta}$ dans le formalisme du théorème local d'indice des familles. Dans [67], nous appliquons ce résultat pour donner une nouvelle démonstration de la conjecture de Hirzebruch sur la signature des variétés modulaires de Hilbert, qui avait été démontrée par Atiyah-Donnelly-Singer.

Dans une série d'articles avec Gillet et Soulé [70, 71, 72], nous démontrons en particulier un théorème de courbure pour la métrique de Quillen sur le déterminant de l'image directe d'un fibré holomorphe. Nous y intégrons le formalisme de la double transgression de Bott et Chern. Le résultat principal est obtenu par la vérification de la compatibilité des constructions de [68, 69] à la géométrie complexe, et aussi par la démonstration de formules d'anomalie étendant les formules de Polyakov.

L'objectif de Gillet et Soulé est de démontrer un théorème arithmétique en géométrie d'Arakelov, en suivant la voie ouverte par Grothendieck, c'est à dire en utilisant des propriétés de fonctorialité.

Je m'intéresse de très près au problème de la fonctorialité par immersion des métriques de Quillen, d'autant plus que l'intégrale fonctionnelle révèle l'importance du rôle de l'immersion de X dans LX .

Avec Vasserot [92], répondant à une question de Miyaoka, j'étudie l'asymptotique de la torsion analytique holomorphe des puissances d'un fibré en droites positif, par les méthodes utilisées dans [38] pour la preuve des inégalités de Demailly.

Dans [41], j'applique le formalisme des superconnexions au problème d'immersion, et démontre la convergence de formes de superconnexion en tant que courants. Dans [73, 74], Gillet, Soulé et moi-même construisons des courants de Bott-Chern associés à des plongements complexes, et nous montrons leur functorialité.

L'intégrale fonctionnelle m'indique que la torsion analytique holomorphe s'écrit formellement comme l'intégrale d'un courant de Bott-Chern sur l'espace des lacets. L'étude du comportement de la métrique de Quillen par immersion peut s'interpréter géométriquement sur l'espace des lacets comme un problème d'intersection avec excès. Naturellement il s'agit là de considérations formelles, dont seules des preuves rigoureuses confirment a posteriori la vérité.

Dans [40], j'accomplis une étape que je crois décisive pour établir la formule d'immersion. Gillet et Soulé avaient en effet conjecturé l'apparition de leur genre $R(x)$, dont le développement fait apparaître des dérivées de la fonction zêta de Riemann aux entiers négatifs impairs. La formule d'immersion devait elle-même contenir ce genre R . Or le schéma de preuve que j'élabore pour calculer la formule fait apparaître des classes caractéristiques exotiques, qui expriment l'excès dans une formule d'intersection en dimension infinie. Dans [40], le calcul est mené rigoureusement et fait effectivement apparaître de genre R .

Avec Bost [62], j'étudie le comportement de la métrique de Quillen associée à une surface de Riemann, lorsque celle-ci dégénère avec des singularités ordinaires. Je reprendrai cette question dans [47] en dimension relative arbitraire.

Avec Cheeger [64, 65, 66], nous démontrons un théorème de l'indice des familles à une famille de variétés à bord. La contribution du bord à la formule d'indice fait apparaître les formes $\tilde{\eta}$ décrites précédemment.

Dans [80], un travail de longue haleine mené avec Lebeau nous conduit à la démonstration de la formule d'immersion rêvée pour les métriques de Quillen. Bien que le plan général de la démonstration soit simple, sa mise en œuvre est techniquement difficile, et requiert de mêler à la fois des techniques d'analyse fonctionnelle, et des méthodes de théorie de l'indice local. Les objets locaux construits dans [40, 73, 74] apparaissent effectivement dans la démonstration, dans une formule exprimant des objets secondaires globaux à l'aide d'objets secondaires locaux. Ce résultat permet à Gillet et Soulé d'achever leur démonstration d'un théorème de Riemann-Roch-Grothendieck en géométrie d'Arakelov.

Avec Köhler [78], je m'attaque ensuite à la démonstration de formules d'anomalie pour les formes de torsion analytique holomorphe.

Dans [42], je montre une formule d'excès en K -théorie pour des courants de Bott-Chern. Dans [43], je montre une autre formule d'excès pour des courants de Bott-Chern, qui appliquée en dimension infinie, redonne formellement le résultat démontré avec Lebeau sur le comportement de la métrique de Quillen par immersion. Ce texte donne quelques clés sur le travail préparatoire ayant mené à un schéma de démonstration de la formule d'immersion.

Avec Zhang [93], nous donnons une extension du théorème de Cheeger-Müller, en utilisant la technique de déformation du complexe de de Rham suggérée par Witten. Nous utilisons pour cela des résultats de Helffer-Sjöstrand et Laudenbach.

Dans [95], nous étendons ces résultats dans un contexte équivariant. Avec Zhang [94], nous étudions le comportement de l'invariant η par immersion.

Avec Berthomieu [2], nous montrons une formule de compatibilité des formes de torsion analytique à la composition de deux submersions quand la base de la seconde submersion est un point. La démonstration met en œuvre des techniques de limite adiabatique, le théorème d'indice local, et des méthodes inspirées de Dai et Melrose.

Dans [44, 45], j'étends les résultats obtenus pour les immersions en situation équivariante. J'obtiens ainsi l'extension équivariante du genre R , et la formule d'immersion correspondante pour le déterminant.

Dans [82], avec Lott, je démontre un théorème de Riemann-Roch-Grothendieck pour les images directes par submersion de fibrés plats. La preuve utilise le formalisme des superconnexions. Dans [83], Lott et moi-même appliquons ce résultat au cas de $SL(n, \mathbf{Z})$ fibrés.

Dans [46], je démontre la compatibilité des formes de torsion analytique à la composition d'une immersion et d'une submersion générale.

Dans un travail avec Labourie [79], nous donnons une preuve des formules de Verlinde par application de la formule de Riemann-Roch-Kawasaki à l'espace des modules des fibrés plats sur une surface de Riemann.

Avec Goette [75], je montre la compatibilité de deux versions de la torsion analytique équivariante holomorphe. Ce résultat confirme le principe suivant lequel la torsion holomorphe est l'intégrale sur l'espace des lacets d'un courant existant universellement, même en dimension finie. La formule obtenue n'est que la manifestation d'un principe de functorialité pour ces courants.

Avec Goette [76], nous étendons les résultats obtenus avec Zhang aux formes de torsion analytique de de Rham. On montre en particulier des résultats de rigidité des formes de torsion analytique. On calcule ces formes explicitement sous une hypothèse très forte d'existence d'une fonction de Morse dans les fibres.

Avec Goette, dans [77], nous obtenons un résultat de comparaison de deux versions des formes de torsion en théorie de de Rham. Le formalisme cohomologique sur l'espace des lacets est beaucoup moins clair. On obtient une formule exprimant la différence entre les objets à l'aide d'un nouvel objet, le V -invariant. La torsion analytique de de Rham est-elle même formellement le V -invariant de l'espace des lacets. Le V -invariant se localise naturellement sur les points critiques d'une fonction de Morse-Bott.

Dans [48], je montre que les formes de torsion équivariante holomorphe du complexe de de Rham sont nulles. Ce résultat est obtenu par comparaison de ces formes aux formes que j'avais construites avec Lott en théorie de de Rham. La torsion est en effet un terme peu explicite apparaissant dans la formule de points fixes de Köhler-Rössler en géométrie d'Arakelov. Le fait que cette torsion soit nulle est intéressant et a été exploité par Maillot et Rössler.

5. THÉORIE DE HODGE ET LAPLACIEN HYPOELLIPTIQUE

Si on admet le paradigme décrit précédemment, la torsion analytique de de Rham devrait se localiser naturellement sur les points critiques de toute fonctionnelle naturelle sur l'espace des lacets, comme la fonctionnelle d'énergie. Ces considérations sont le point de départ de [49], où je construis une déformation du laplacien de Hodge d'une variété riemannienne X , en une famille de laplaciens hypoelliptiques

sur l'espace total \mathcal{X}^* du fibré cotangent T^*X , qui interpole entre le laplacien usuel et le générateur du flot géodésique. Le laplacien hypoelliptique est essentiellement une somme pondérée de l'oscillateur harmonique de la fibre et du générateur du flot géodésique sur \mathcal{X}^* . Les équations de mécanique aléatoire dégagées dans [3, 25] réapparaissent ici dans un contexte géométrique.

Dans un travail mené avec Lebeau [81], nous démontrons une série de résultats d'analyse sur le laplacien hypoelliptique. Un calcul pseudodifférentiel adéquat y est développé, qui permet en particulier de montrer en un sens très précis que le laplacien hypoelliptique est bien une déformation du laplacien de Hodge usuel. Nous vérifions en particulier que la torsion analytique du laplacien hypoelliptique est égale à la torsion analytique du laplacien elliptique.

Dans [50], nous relierons la construction du laplacien hypoelliptique en théorie de de Rham au théorème de Chern-Gauss-Bonnet. Dans l'article [53], nous donnons plusieurs motivations heuristiques qui toutes aboutissent à la construction du laplacien hypoelliptique de [49].

Dans l'article [51], nous montrons que tout opérateur de Dirac sur une variété compacte X possède une déformation hypoelliptique agissant sur l'espace total \mathcal{X} du fibré tangent TX . Cette déformation est de nature différente de celle qui a été traitée en [49], bien qu'au niveau symbolique, elle soit de même nature. Pour les variétés complexes kählériennes, elle permet d'obtenir une déformation du laplacien de Hodge associé au complexe de Dolbeault. Dans ce cas, la déformation hypoelliptique fait intervenir le complexe de Koszul de la fibre TX . Nous relierons la métrique de Quillen hypoelliptique à la métrique de Quillen elliptique par une formule où intervient le genre R de Gillet-Soulé.

Dans [54], nous donnons une présentation synthétique de la construction du laplacien hypoelliptique en théorie de de Rham, et aussi pour l'opérateur de Dirac.

6. LAPLACIEN HYPOELLIPTIQUE ET FORMULE DE TRACES

Dans [52], nous amorçons l'application de la théorie du laplacien hypoelliptique aux espaces symétriques. Cet article est en effet consacré à une nouvelle dérivation de la formule de Poisson pour le noyau de la chaleur sur un groupe de Lie compact à l'aide d'un laplacien hypoelliptique. L'opérateur de Dirac de Kostant joue un rôle clef dans la construction du laplacien hypoelliptique adapté à la situation considérée. Cet opérateur n'est pas un cas particulier des opérateurs décrits précédemment. Cette construction a deux motivations. Il s'agit tout d'abord d'exhiber le lien entre le noyau de la chaleur sur le groupe et la cohomologie équivariante de son espace de lacets, la déformation hypoelliptique réalisant explicitement la preuve de la formule de localisation correspondante. Il s'agit aussi de mettre à l'épreuve les méthodes que nous comptons appliquer ultérieurement aux espaces symétriques de type non compact.

Dans [55, 57], nous réalisons le programme décrit précédemment. Soit en effet G un groupe réductif d'algèbre de Lie \mathfrak{g} , soit $K \subset G$ un compact maximal, et soit $X = G/K$ l'espace symétrique correspondant. Soit $\gamma \in G$ un élément semisimple, et soit $\rho : K \rightarrow \text{Aut}(E)$ une représentation unitaire de K , de telle sorte que E descend en un fibré Hermitien F sur X . Dans [55, 57], on donne une formule explicite pour l'intégrale orbitale associée à $\exp(t\Delta^X/2)$, où $-\Delta^X$ est l'action du Casimir sur $C^\infty(X, F)$. Plus généralement, si $\mu : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ est une fonction paire à décroissance rapide dont la transformée de Fourier est à support compact, on obtient

une formule correspondante pour l'intégrale orbitale associée à $\mu(\sqrt{-\Delta^X + c})$. On utilise encore l'opérateur de Dirac de Kostant. Le laplacien hypoelliptique agit ici sur $G \times_K \mathfrak{g} \simeq X \times \mathfrak{g}$. Les démonstrations utilisent de manière essentielle des techniques probabilistes issues du calcul de Malliavin, et également une application systématique du théorème de Toponogov, de manière à contrôler quantitativement la convergence de la diffusion hypoelliptique vers le flot géodésique, quand le paramètre b de déformation hypoelliptique tend vers $+\infty$. Les formules de [57] ressemblent, au moins formellement, aux formules d'indice d'Atiyah-Singer. Le rôle du \hat{A} -genre est rempli ici par une fonction $J_\gamma(Y_0^k)$ définie sur la partie compacte $\mathfrak{k}(\gamma)$ de l'algèbre de Lie $\mathfrak{j}(\gamma)$ du centralisateur $Z(\gamma)$.

Dans [56, 59], nous présentons l'ensemble des idées qui relient indice, intégration sur l'espace des lacets, formules de localisation, et laplacien hypoelliptique. Ces deux articles donnent une approche non technique des idées décrites précédemment.

Des travaux de Bergeron et Venkatesh [1] d'une part, de Müller [98] d'autre part, ont montré l'intérêt de l'étude de l'asymptotique de la torsion analytique en théorie de de Rham, soit lorsqu'on monte dans la tour des revêtements de la variété considérée, soit lorsqu'on fait croître le fibré plat vers « l'infini » de manière convenable. Avec Ma et Zhang [84, 85], nous donnons un calcul de l'asymptotique de la torsion analytique d'une variété compacte, lorsque les fibrés plats sont des images directes holomorphes F_p des puissances L^p d'un fibré en droites positif L le long des fibres complexes d'une fibration plate au dessus de la variété considérée. Sous une hypothèse forte de non platitude d'une métrique, on calcule la torsion asymptotique. Quand la variété est un espace localement symétrique, on retrouve ces résultats en utilisant les formules de trace de [57].

Dans [61], nous appliquons les méthodes du laplacien hypoelliptique pour obtenir à nouveau des résultats de Moscovici et Stanton [97] sur le calcul des invariants $\hat{\eta}$ d'opérateurs de Dirac sur les espaces localement symétriques. Une telle extension n'allait pas de soi. Dans [57], nous n'avions en effet traité que les intégrales orbitales associées à l'opérateur de Casimir. Ici, il s'agit de faire intervenir l'opérateur de Dirac classique, dont le carré coïncide avec le Casimir à un opérateur constant près. Pour résoudre cette difficulté, le formalisme des superconnexions de Quillen s'applique à nouveau. Nous avons en effet montré que l'invariant $\hat{\eta}$ s'écrit naturellement comme une transgression dans le formalisme des superconnexions. Dans le contexte de la formule des traces, ce formalisme peut à nouveau être utilisé, mais avec une signification différente. La déformation hypoelliptique a maintenant deux paramètres, le paramètre $b > 0$ originel, et le paramètre ϑ qui exprime une rotation dans l'algèbre de Clifford.

Dans un article avec Shen [88, 89], nous étendons les formules de [57] à tous les noyaux naturels sur un espace symétrique associés au centre de l'algèbre enveloppante. Nos résultats prennent comme point de départ les formules de [57] où seul apparaît le Casimir. On utilise des méthodes de déformation inspirées d'Harish-Chandra pour évaluer les intégrales orbitales semisimples quand γ est régulier, puis des arguments de limite quand γ est semi-simple sans être nécessairement régulier. Les symétries cachées de la fonction $J_\gamma(Y_0^\gamma)$ interviennent dans les preuves.

7. COHOMOLOGIE DE BOTT-CHERN ET THÉORÈME DE RIEMANN-ROCH

Soit $\pi : M \rightarrow S$ une projection holomorphe propre, soit F un fibré holomorphe sur M et soit $R\pi_*F$ sont image directe, qu'on suppose localement libre. Soit

$H_{\text{BC}}^{(=)}(S, \mathbf{C})$ la cohomologie de Bott-Chern de S , qui est le quotient de l'espace des formes fermées qui sont somme de formes de type (p, p) par l'image de $\bar{\partial}\partial$. Dans [58, 60], nous démontrons le théorème de Riemann-Roch-Grothendieck attendu dans $H_{\text{BC}}^{(=)}(S, \mathbf{C})$, sans aucune autre hypothèse. Dans le cas où les variétés sont projectives, ou même kählériennes, ce résultat était déjà connu. Dans le cas général, les preuves analytiques traditionnelles échouent pour des raisons fondamentales. Plus précisément, en général, les « annulations extraordinaires » que nous avons utilisées avec Gillet et Soulé dans [70, 71] ne se produisent plus. Bien plus la déformation hypoelliptique du complexe de Dolbeault-Hodge que nous avons introduite dans [51] ne permet pas d'obtenir le résultat. Dans [58, 60], on construit une déformation hypoelliptique exotique de la théorie de Hodge pour le complexe de Dolbeault. Dans le laplacien hypoelliptique correspondant, le potentiel quadratique traditionnel associé à l'oscillateur harmonique de la fibre est remplacé par un potentiel d'ordre 4. Pour ce nouveau laplacien, on peut montrer que les « annulations extraordinaires » se produisent encore, ce qui permet d'obtenir le résultat.

Dans un travail avec Shen et Wei [90], nous levons les restrictions imposées par les résultats de [60]. L'article [90] contient deux progrès significatifs.

- (1) Le premier est la construction d'un caractère de Chern défini sur $K(X)$, le groupe de Grothendieck des faisceaux cohérents sur X à valeurs dans $H_{\text{BC}}^{(=)}(X, \mathbf{R})$. On utilise une équivalence de catégories démontrée par Block entre la catégorie dérivée $D^{\text{bcoh}}(X)$, et la catégorie des superconnexions holomorphes. On peut alors développer une théorie de Chern-Weil pour les superconnexions de Block, et obtenir un caractère de Chern pour les faisceaux cohérents.
- (2) La démonstration du théorème de Riemann-Roch-Grothendieck pour les superconnexions antiholomorphes. Pour les immersions, on utilise la déformation au cône normal, pour les submersions, on utilise les méthodes de [60].

RÉFÉRENCES

- [1] N. Bergeron and A. Venkatesh. The asymptotic growth of torsion homology for arithmetic groups. *J. Inst. Math. Jussieu*, 12(2) :391–447, 2013. URL : <http://dx.doi.org/10.1017/S1474748012000667>, doi:10.1017/S1474748012000667.
- [2] A. Berthomieu and J.-M. Bismut. Quillen metrics and higher analytic torsion forms. *J. Reine Angew. Math.*, 457 :85–184, 1994. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1994.pdf>.
- [3] J.-M. Bismut. Conjugate convex functions in optimal stochastic control. *J. Math. Anal. Appl.*, 44 :384–404, 1973. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1973.pdf>, doi:[http://dx.doi.org/10.1016/0022-247X\(73\)90066-8](http://dx.doi.org/10.1016/0022-247X(73)90066-8).
- [4] J.-M. Bismut. An example of optimal stochastic control with constraints. *SIAM J. Control*, 12 :401–418, 1974. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1974.pdf>.
- [5] J.-M. Bismut. Growth and optimal intertemporal allocation of risks. *J. Econom. Theory*, 10(2) :239–257, 1975. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1975.pdf>.
- [6] J.-M. Bismut. Linear quadratic optimal stochastic control with random coefficients. *SIAM J. Control Optimization*, 14(3) :419–444, 1976. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1976.pdf>.
- [7] J.-M. Bismut. Théorie probabiliste du contrôle des diffusions. *Mem. Amer. Math. Soc.*, 4(167) :xiii+130, 1976. doi:<http://dx.doi.org/10.1090/memo/0167>.
- [8] J.-M. Bismut. Contrôle stochastique, jeux et temps d'arrêt : applications de la théorie probabiliste du potentiel. *Z. Wahrscheinlichkeitstheorie und Verw. Gebiete*, 39(4) :315–338, 1977. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1977a.pdf>.

- [9] J.-M. Bismut. Dualité convexe, temps d'arrêt optimal et contrôle stochastique. *Z. Wahrscheinlichkeitstheorie und Verw. Gebiete*, 38(3) :169–198, 1977. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1977b.pdf>.
- [10] J.-M. Bismut. Probability theory methods in zero-sum stochastic games. *SIAM J. Control Optimization*, 15(4) :539–545, 1977. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1977d.pdf>.
- [11] J.-M. Bismut. Sur un problème de Dynkin. *Z. Wahrscheinlichkeitstheorie und Verw. Gebiete*, 39(1) :31–53, 1977. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1977c.pdf>.
- [12] J.-M. Bismut. Control of jump processes and applications. *Bull. Soc. Math. France*, 106(1) :25–60, 1978. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1978.pdf>.
- [13] J.-M. Bismut. Contrôle des systèmes linéaires quadratiques : applications de l'intégrale stochastique. In *Séminaire de Probabilités, XII (Univ. Strasbourg, Strasbourg, 1976/1977)*, volume 649 of *Lecture Notes in Math.*, pages 180–264. Springer, Berlin, 1978. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1978f.pdf>.
- [14] J.-M. Bismut. Duality methods in the control of densities. *SIAM J. Control Optim.*, 16(5) :771–777, 1978. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1978c.pdf>.
- [15] J.-M. Bismut. An introductory approach to duality in optimal stochastic control. *SIAM Rev.*, 20(1) :62–78, 1978. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1978d.pdf>.
- [16] J.-M. Bismut. Contrôle de processus alternants et applications. *Z. Wahrsch. Verw. Gebiete*, 47(3) :241–288, 1979. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1979a.pdf>.
- [17] J.-M. Bismut. Potential theory in optimal stopping and alternating processes. In *Stochastic control theory and stochastic differential systems (Proc. Workshop, Deutsch. Forschungsgemeinschaft., Univ. Bonn, Bad Honnef, 1979)*, volume 16 of *Lecture Notes in Control and Information Sci.*, pages 285–293. Springer, Berlin, 1979. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1979e.pdf>.
- [18] J.-M. Bismut. Problèmes à frontière libre et arbres de mesures. In *Séminaire de Probabilités, XIII (Univ. Strasbourg, Strasbourg, 1977/78)*, volume 721 of *Lecture Notes in Math.*, pages 495–520. Springer, Berlin, 1979. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1979c.pdf>.
- [19] J.-M. Bismut. Temps d'arrêt optimal, quasi-temps d'arrêt et retournement du temps. *Ann. Probab.*, 7(6) :933–964, 1979. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1979.pdf>.
- [20] J.-M. Bismut. Duality methods in the control of semimartingales. In *Analysis and optimisation of stochastic systems (Proc. Internat. Conf., Univ. Oxford, Oxford, 1978)*, pages 49–72. Academic Press, London, 1980.
- [21] J.-M. Bismut. Convex inequalities in stochastic control. *J. Funct. Anal.*, 42(2) :226–270, 1981. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1981.pdf>.
- [22] J.-M. Bismut. A generalized formula of Itô and some other properties of stochastic flows. *Z. Wahrsch. Verw. Gebiete*, 55(3) :331–350, 1981. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1981a.pdf>.
- [23] J.-M. Bismut. Martingales, the Malliavin calculus and Hörmander's theorem. In *Stochastic integrals (Proc. Sympos., Univ. Durham, Durham, 1980)*, volume 851 of *Lecture Notes in Math.*, pages 85–109. Springer, Berlin, 1981. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1981e.pdf>.
- [24] J.-M. Bismut. Martingales, the Malliavin calculus and hypoellipticity under general Hörmander's conditions. *Z. Wahrsch. Verw. Gebiete*, 56(4) :469–505, 1981. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1981c.pdf>.
- [25] J.-M. Bismut. *Mécanique aléatoire*, volume 866 of *Lecture Notes in Mathematics*. Springer-Verlag, Berlin, 1981. With an English summary.
- [26] J.-M. Bismut. *Mécanique aléatoire*. In *Tenth Saint Flour Probability Summer School—1980 (Saint Flour, 1980)*, volume 929 of *Lecture Notes in Math.*, pages 1–100. Springer, Berlin, 1982. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1982.pdf>.
- [27] J.-M. Bismut. Le théorème d'Atiyah-Singer pour les opérateurs elliptiques classiques : une approche probabiliste. *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.*, 297(8) :481–484, 1983.

- [28] J.-M. Bismut. The Atiyah-Singer theorems : a probabilistic approach. II. The Lefschetz fixed point formulas. *J. Funct. Anal.*, 57(3) :329–348, 1984. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1984c.pdf>.
- [29] J.-M. Bismut. The calculus of boundary processes. *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)*, 17(4) :507–622, 1984. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1984a.pdf>.
- [30] J.-M. Bismut. Jump processes and boundary processes. In *Stochastic analysis (Katata/Kyoto, 1982)*, volume 32 of *North-Holland Math. Library*, pages 53–104. North-Holland, Amsterdam, 1984. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1984e.pdf>.
- [31] J.-M. Bismut. *Large deviations and the Malliavin calculus*, volume 45 of *Progress in Mathematics*. Birkhäuser Boston Inc., Boston, MA, 1984.
- [32] J.-M. Bismut. On the set of zeros of certain semimartingales. *Proc. London Math. Soc. (3)*, 49(1) :73–86, 1984. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1984d.pdf>.
- [33] J.-M. Bismut. Index theorem and equivariant cohomology on the loop space. *Comm. Math. Phys.*, 98(2) :213–237, 1985. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1985.pdf>.
- [34] J.-M. Bismut. The infinitesimal Lefschetz formulas : a heat equation proof. *J. Funct. Anal.*, 62(3) :435–457, 1985. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1985b.pdf>.
- [35] J.-M. Bismut. Last exit decompositions and regularity at the boundary of transition probabilities. *Z. Wahrsch. Verw. Gebiete*, 69(1) :65–98, 1985. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1985c.pdf>.
- [36] J.-M. Bismut. The Atiyah-Singer index theorem for families of Dirac operators : two heat equation proofs. *Invent. Math.*, 83(1) :91–151, 1986. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1986c.pdf>.
- [37] J.-M. Bismut. Localization formulas, superconnections, and the index theorem for families. *Comm. Math. Phys.*, 103(1) :127–166, 1986. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1986b.pdf>.
- [38] J.-M. Bismut. Demailly’s asymptotic Morse inequalities : a heat equation proof. *J. Funct. Anal.*, 72(2) :263–278, 1987. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1987.pdf>.
- [39] J.-M. Bismut. Filtering equation, equivariant cohomology and the Chern character. In *VIIIth international congress on mathematical physics (Marseille, 1986)*, pages 17–56. World Sci. Publishing, Singapore, 1987. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1987b.pdf>.
- [40] J.-M. Bismut. Koszul complexes, harmonic oscillators, and the Todd class. *J. Amer. Math. Soc.*, 3(1) :159–256, 1990. With an appendix by the author and C. Soulé. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1990g.pdf>.
- [41] J.-M. Bismut. Superconnection currents and complex immersions. *Invent. Math.*, 99(1) :59–113, 1990. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1990d.pdf>.
- [42] J.-M. Bismut. Bott-Chern currents, excess normal bundles and the Chern character. *Geom. Funct. Anal.*, 2(3) :285–340, 1992. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1992d.pdf>.
- [43] J.-M. Bismut. Complex equivariant intersection, excess normal bundles and Bott-Chern currents. *Comm. Math. Phys.*, 148(1) :1–55, 1992. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1992e.pdf>.
- [44] J.-M. Bismut. Equivariant short exact sequences of vector bundles and their analytic torsion forms. *Compositio Math.*, 93(3) :291–354, 1994. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1994.pdf>.
- [45] J.-M. Bismut. Equivariant immersions and Quillen metrics. *J. Differential Geom.*, 41(1) :53–157, 1995. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1995a.pdf>.
- [46] J.-M. Bismut. Holomorphic families of immersions and higher analytic torsion forms. *Astérisque*, (244) :viii+275, 1997. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1997b.pdf>.
- [47] J.-M. Bismut. Quillen metrics and singular fibres in arbitrary relative dimension. *J. Algebraic Geom.*, 6(1) :19–149, 1997.

- [48] J.-M. Bismut. Holomorphic and de Rham torsion. *Compos. Math.*, 140(5) :1302–1356, 2004. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/2004g.pdf>, doi:10.1112/S0010437X04000478.
- [49] J.-M. Bismut. The hypoelliptic Laplacian on the cotangent bundle. *J. Amer. Math. Soc.*, 18(2) :379–476 (electronic), 2005. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/2005.pdf>.
- [50] J.-M. Bismut. The hypoelliptic Laplacian and Chern-Gauss-Bonnet. In *Differential geometry and physics*, volume 10 of *Nankai Tracts Math.*, pages 38–52. World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2006. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/2006a.pdf>.
- [51] J.-M. Bismut. The hypoelliptic Dirac operator. In *Geometry and dynamics of groups and spaces*, volume 265 of *Progr. Math.*, pages 113–246. Birkhäuser, Basel, 2008. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/2008.pdf>, doi:10.1007/978-3-7643-8608-5_3.
- [52] J.-M. Bismut. The hypoelliptic Laplacian on a compact Lie group. *J. Funct. Anal.*, 255(9) :2190–2232, 2008. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/2008a.pdf>, doi:10.1016/j.jfa.2008.07.017.
- [53] J.-M. Bismut. Loop spaces and the hypoelliptic Laplacian. *Comm. Pure Appl. Math.*, 61(4) :559–593, 2008. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/2008b.pdf>, doi:10.1002/cpa.20190.
- [54] J.-M. Bismut. A survey of the hypoelliptic Laplacian. *Astérisque*, (322) :39–69, 2008. Géométrie différentielle, physique mathématique, mathématiques et société. II. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/2008f.pdf>.
- [55] J.-M. Bismut. Laplacien hypoelliptique et intégrales orbitales. *C. R. Math. Acad. Sci. Paris*, 347(19-20) :1189–1195, 2009. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/2009a.pdf>, doi:10.1016/j.crma.2009.09.014.
- [56] J.-M. Bismut. Duistermaat-Heckman formulas and index theory. In *Geometric Aspects of Analysis and Mechanics*, volume 292 of *Progr. Math.*, pages 1–55. Birkhäuser/Springer, New York, 2011. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/2011e.pdf>, doi:10.1007/978-0-8176-8244-6_1.
- [57] J.-M. Bismut. *Hypoelliptic Laplacian and orbital integrals*, volume 177 of *Annals of Mathematics Studies*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2011. URL : <http://press.princeton.edu/titles/9629.html>.
- [58] J.-M. Bismut. Laplacien hypoelliptique et cohomologie de Bott-Chern. *C. R. Math. Acad. Sci. Paris*, 349(1-2) :75–80, 2011. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/2011a.pdf>, doi:10.1016/j.crma.2010.12.003.
- [59] J.-M. Bismut. Index theory and the hypoelliptic Laplacian. In *Metric and differential geometry*, number 297 in *Progress in Mathematics*, pages 181–232. Birkhäuser/Springer, Basel, 2012. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/2012a.pdf>, doi:10.1007/978-3-0348-0257-4_8.
- [60] J.-M. Bismut. *Hypoelliptic Laplacian and Bott-Chern cohomology*, volume 305 of *Progress in Mathematics*. Birkhäuser/Springer, Cham, 2013. A theorem of Riemann-Roch-Grothendieck in complex geometry. doi:10.1007/978-3-319-00128-9.
- [61] J.-M. Bismut. Eta invariants and the hypoelliptic Laplacian. *J. Eur. Math. Society*, 21(8) :2355–2515, 2019. URL : <http://arxiv.org/abs/1603.05103>, doi:10.4171/JEMS/887.
- [62] J.-M. Bismut and J.-B. Bost. Fibrés déterminants, métriques de Quillen et dégénérescence des courbes. *Acta Math.*, 165(1-2) :1–103, 1990. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1990i.pdf>.
- [63] J.-M. Bismut and J. Cheeger. η -invariants and their adiabatic limits. *J. Amer. Math. Soc.*, 2(1) :33–70, 1989. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1989.pdf>.
- [64] J.-M. Bismut and J. Cheeger. Families index for manifolds with boundary, superconnections, and cones. I. Families of manifolds with boundary and Dirac operators. *J. Funct. Anal.*, 89(2) :313–363, 1990. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1990e.pdf>.
- [65] J.-M. Bismut and J. Cheeger. Families index for manifolds with boundary, superconnections and cones. II. The Chern character. *J. Funct. Anal.*, 90(2) :306–354, 1990. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1990f.pdf>.

- [66] J.-M. Bismut and J. Cheeger. Remarks on the index theorem for families of Dirac operators on manifolds with boundary. In *Differential geometry*, volume 52 of *Pitman Monogr. Surveys Pure Appl. Math.*, pages 59–83. Longman Sci. Tech., Harlow, 1991. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1991b.pdf>.
- [67] J.-M. Bismut and J. Cheeger. Transgressed Euler classes of $SL(2n, \mathbf{Z})$ vector bundles, adiabatic limits of eta invariants and special values of L -functions. *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)*, 25(4) :335–391, 1992. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1992b.pdf>.
- [68] J.-M. Bismut and D.S. Freed. The analysis of elliptic families. I. Metrics and connections on determinant bundles. *Comm. Math. Phys.*, 106(1) :159–176, 1986. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1986.pdf>.
- [69] J.-M. Bismut and D.S. Freed. The analysis of elliptic families. II. Dirac operators, eta invariants, and the holonomy theorem. *Comm. Math. Phys.*, 107(1) :103–163, 1986. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1986a.pdf>.
- [70] J.-M. Bismut, H. Gillet, and C. Soulé. Analytic torsion and holomorphic determinant bundles. I. Bott-Chern forms and analytic torsion. *Comm. Math. Phys.*, 115(1) :49–78, 1988. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1988.pdf>.
- [71] J.-M. Bismut, H. Gillet, and C. Soulé. Analytic torsion and holomorphic determinant bundles. II. Direct images and Bott-Chern forms. *Comm. Math. Phys.*, 115(1) :79–126, 1988. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1988a.pdf>.
- [72] J.-M. Bismut, H. Gillet, and C. Soulé. Analytic torsion and holomorphic determinant bundles. III. Quillen metrics on holomorphic determinants. *Comm. Math. Phys.*, 115(2) :301–351, 1988. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1988b.pdf>.
- [73] J.-M. Bismut, H. Gillet, and C. Soulé. Bott-Chern currents and complex immersions. *Duke Math. J.*, 60(1) :255–284, 1990. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1990.pdf>.
- [74] J.-M. Bismut, H. Gillet, and C. Soulé. Complex immersions and Arakelov geometry. In *The Grothendieck Festschrift, Vol. I*, volume 86 of *Progr. Math.*, pages 249–331. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1990. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1990k.pdf>.
- [75] J.-M. Bismut and S. Goette. Holomorphic equivariant analytic torsions. *Geom. Funct. Anal.*, 10(6) :1289–1422, 2000. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/2000b.pdf>.
- [76] J.-M. Bismut and S. Goette. Families torsion and Morse functions. *Astérisque*, (275) :x+293, 2001.
- [77] J.-M. Bismut and S. Goette. Equivariant de Rham torsions. *Ann. of Math. (2)*, 159(1) :53–216, 2004. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/2004b.pdf>, doi:10.4007/annals.2004.159.53.
- [78] J.-M. Bismut and K. Köhler. Higher analytic torsion forms for direct images and anomaly formulas. *J. Algebraic Geom.*, 1(4) :647–684, 1992. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1992a.pdf>.
- [79] J.-M. Bismut and F. Labourie. Symplectic geometry and the Verlinde formulas. In *Surveys in differential geometry : differential geometry inspired by string theory*, volume 5 of *Surv. Differ. Geom.*, pages 97–311. Int. Press, Boston, MA, 1999. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1999a.pdf>.
- [80] J.-M. Bismut and G. Lebeau. Complex immersions and Quillen metrics. *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.*, (74) :ii+298 pp. (1992), 1991. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1991.pdf>.
- [81] J.-M. Bismut and G. Lebeau. *The hypoelliptic Laplacian and Ray-Singer metrics*, volume 167 of *Annals of Mathematics Studies*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2008. URL : <http://press.princeton.edu/titles/8838.html>.
- [82] J.-M. Bismut and J. Lott. Flat vector bundles, direct images and higher real analytic torsion. *J. Amer. Math. Soc.*, 8(2) :291–363, 1995. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1995.pdf>.
- [83] J.-M. Bismut and J. Lott. Torus bundles and the group cohomology of $GL_n(\mathbf{Z})$. *J. Differential Geom.*, 47(2) :196–236, 1997. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1997.pdf>.

- [84] J.-M. Bismut, X. Ma, and W. Zhang. Opérateurs de Toeplitz et torsion analytique asymptotique. *C. R. Math. Acad. Sci. Paris*, 349(17–18) :977–981, 2011. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/2011c.pdf>, doi:doi:10.1016/j.crma.2011.08.010.
- [85] J.-M. Bismut, X. Ma, and W. Zhang. Asymptotic torsion and Toeplitz operators. *J. Inst. Math. Jussieu*, 16(2) :223–349, 2017. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/2017.pdf>, doi:10.1017/S1474748015000171.
- [86] J.-M. Bismut and D. Michel. Diffusions conditionnelles. I. Hypoellipticité partielle. *J. Funct. Anal.*, 44(2) :174–211, 1981. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1981b.pdf>.
- [87] J.-M. Bismut and D. Michel. Diffusions conditionnelles. II. Générateur conditionnel. Application au filtrage. *J. Funct. Anal.*, 45(2) :274–292, 1982. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1982a.pdf>.
- [88] J.-M. Bismut and S. Shen. Geometric orbital integrals and the center of the enveloping algebra. *arXiv e-prints*, page arXiv :1910.11731, October 2019. URL : <https://arxiv.org/pdf/1910.11731.pdf>, arXiv:1910.11731.
- [89] J.-M. Bismut and S. Shen. Intégrales orbitales semi-simples et centre de l’algèbre enveloppante. *C. R. Math. Acad. Sci. Paris*, 357(11-12) :897–906, 2019. doi:<https://doi.org/10.1016/j.crma.2019.11.001>.
- [90] J.-M. Bismut, S. Shen, and Z. Wei. Coherent sheaves, superconnections, and RRG. *arXiv e-prints*, February 2021. URL : <https://arxiv.org/abs/2102.08129>, arXiv:2102.08129.
- [91] J.-M. Bismut and B. Skalli. Temps d’arrêt optimal, théorie générale des processus et processus de Markov. *Z. Wahrscheinlichkeitstheorie und Verw. Gebiete*, 39(4) :301–313, 1977. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1977.pdf>.
- [92] J.-M. Bismut and É. Vasserot. The asymptotics of the Ray-Singer analytic torsion associated with high powers of a positive line bundle. *Comm. Math. Phys.*, 125(2) :355–367, 1989. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1989a.pdf>.
- [93] J.-M. Bismut and W. Zhang. An extension of a theorem by Cheeger and Müller. *Astérisque*, (205) :235, 1992. With an appendix by François Laudenbach. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1992.pdf>.
- [94] J.-M. Bismut and W. Zhang. Real embeddings and eta invariants. *Math. Ann.*, 295(4) :661–684, 1993. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1993.pdf>.
- [95] J.-M. Bismut and W. Zhang. Milnor and Ray-Singer metrics on the equivariant determinant of a flat vector bundle. *Geom. Funct. Anal.*, 4(2) :136–212, 1994. URL : <http://www.math.u-psud.fr/~bismut/Bismut/1994a.pdf>.
- [96] J. Block. Duality and equivalence of module categories in noncommutative geometry. In *A celebration of the mathematical legacy of Raoul Bott*, volume 50 of *CRM Proc. Lecture Notes*, pages 311–339. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2010.
- [97] H. Moscovici and R. J. Stanton. Eta invariants of Dirac operators on locally symmetric manifolds. *Invent. Math.*, 95(3) :629–666, 1989.
- [98] W. Müller. The asymptotics of the Ray-Singer analytic torsion of hyperbolic 3-manifolds. In *Metric and differential geometry*, volume 297 of *Progr. Math.*, pages 317–352. Birkhäuser/Springer, Basel, 2012. URL : http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-0257-4_11, doi:10.1007/978-3-0348-0257-4_11.

INSTITUT DE MATHÉMATIQUE D’ORSAY, UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, BÂTIMENT 307, 91405 ORSAY, FRANCE

Email address: Jean-Michel.Bismut@universite-paris-saclay.fr